

B. ¿PORQUE UTILIZAR ACTIFOS K?

- ✔ Fitovacuna contra enfermedades.
- ✔ Activa defensas de la planta.
- ✔ Elimina enfermedades.
- ✔ Protección para los cultivos.
- ✔ Fitoalexinas de amplio espectro contra fitopatogenos.
- ✔ Aporta potasio.

USO AGRICOLA

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Fitovacuna que activa las defensas de la planta contra enfermedades y bacterias, actúa sobre el sistema hormonal, promueve la producción de fitoalexinas para fortalecer los tejidos y estimular el mecanismo de autodefensa de la planta.

D. MÉTODO DE PREPARACIÓN

Suministrar dependiendo de la etapa del cultivo. Llene el tanque al 70 % de su capacidad con agua, vacíe la dosis de actifos-k, agite vigorosamente la mezcla y agregue el agua restante a la mezcla. Agite nuevamente para homogeneizar la mezcla. La aplicación foliar debe de hacer a punto de rocío, sin exceder los volúmenes recomendados, para evitar el aumento de la de la concentración del producto y evitar el daño por quemaduras sobre bordes y puntas de las hojas.

Acondicionar el agua con adherente, surfactante. Ajustar pH a 5.5 - 6.0 con trifertil.

Se recomienda aplicar en etapas críticas y como preventivo.

Se recomienda hacer las aplicaciones en las horas frescas del día (por las mañanas o noches)

C. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	(%)
Fósforo (P)	30.00%
Potasio (K)	20.00%
Inertes	50.00%

E. ETAPA DE APLICACIÓN

DOSIS GENERAL RECOMENDADA:

FOLIAR: 2 ML POR 1 L DE AGUA

RIEGO: 5 ML POR 1 L DE AGUA

HORTALIZAS Y ORNAMENTALES

- **SOLANACEAS:** TOMATE ROJO, CHILE, PIMIENTO MORRÓN, PAPA, TOMATE VERDE, BERENJENA Y TABA
- **CUCURBITACEAS:** PEPINO, CALABAZA, CALABACITA, MELON, SANDIA Y CHAYOTE
- **ALLIACEAS:** CEBOLLA, CEBOLLÍN, AJO Y PORO
- **BRASSICAS:** BROCOLI, COL, COLIFLOR Y COL DE BRUSELAS
- **VEGETALES:** LECHUGA Y RÁBANO
- **ORNAMENTALES Y VIVEROS**

MOMENTO	FRECUENCIA / DRENCH (L/HA)		FRECUENCIA / FOLIAR (ml/L)	
Trasplante	1 Vez	3	15 días	3 ml
Desarrollo	15 días	4	15 días	5 ml
Floración	15 días	4	15 días	5 ml
Fructificación	15 días	4	15 días	5 ml

FRUTALES

- **CITRICOS:** NARANJA, LIMON, LIMA, MANDARINA, TORONJA Y CIDRA
- **FRUTALES DE HUESO:** DURAZNO, CHABACANO, CEREZO Y CIRUELO
- **FRUTALES POMÁCEOS:** MANZANO, PERAL, TEJOCOTE Y MEMBRILLO
- **OTROS FRUTALES:** MANGO, PAPAYA, PIÑA, NOGAL, AGUACATE, PLATANO, BANANO, GUAYABA, VID

MOMENTO	INYECTADO (ML/L)	FRECUENCIA / FOLIAR (ml/L)	
Desarrollo vegetativo.	2 ml por litro de agua e inyectar 40 ml de la mezcla por árbol	20 días	3 ml
Inicio de floración.	2 ml por litro de agua e inyectar 40 ml de la mezcla por árbol	20 días	5 ml
Cuajado/Caida de petalos.	2 ml por litro de agua e inyectar 40 ml de la mezcla por árbol	20 días	5 ml
Fructificación	2 ml por litro de agua e inyectar 40 ml de la mezcla por árbol	20 días	5 ml

GRANOS BÁSICOS Y OLEAGINOSAS

- **CEREALES DE GRANO PEQUEÑO:** ARROZ, AVENA, CENTENO, CEBADA, TRIGO Y TRITICALE
- **GRANOS BÁSICOS:** MAÍZ Y SORGO
- **LEGUMINOSAS:** ALFALFA, HABA, GARBANZO, FRIJOL EJOTERO, FRIJOL GRANO Y CHÍCHARO
- **CULTIVOS INDUSTRIALES:** GIRASOL, CARTAMO Y CAÑA DE AZÚCAR

DOSIS FOLIAR (ml/L)

OBSERVACIONES

3 ml

Disolver en 300 L de agua y aplicar hasta punto de rocío

F. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- **Apariencia:** Líquido
- **Color:** Azul
- **Olor:** Característico
- **Solubilidad en agua:** Totalmente miscible

G. COMPATIBILIDAD

Actifos K es incompatible con dimetoato, dicofol y con productos que contiene cobre, aceites minerales, azufre o con productos de reacción alcalina. Cuando el cultivo se haya realizado aplicaciones con productos con cobre, actifos k debe aplicarse después de transcurrir 15 días.

G. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- “RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”
- “MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”
- “RESPETE LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS”
- “NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACIOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RIOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”
- “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACION, EN SUELOS, RIOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”
- “RESPETE LAS DOSIS Y EPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”
- “PARTICULARMENTE EN SUELOS ARENOSOS O TERRENOS CERCANOS A RIOS, LAGOS O LAGUNAS O CON MANTOS DE AGUA SOMEROS, APLIQUE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE NITRÓGENO DE SU CULTIVO Y DIVIDA EN VARIAS APLICACIONES PARA SU MÁXIMO APROVECHAMIENTO”
- NO APLIQUE ESTE PRODUCTO ANTES DE UNA LLUVIA”

H. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO -“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”. -“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”. -“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”. -“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”. -“NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”. -“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MEDICO”.